



**Представництво компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні**

[WWW.FEEDFOOD.COM.UA](http://WWW.FEEDFOOD.COM.UA)

Україна, 02089, м. Київ, пр. Броварський, 16 км. к. 9,  
 моб. +38(050)473-28-32, факс: 8(044) 549-07-57 .

## **Фид-Фуд Меджик Антистресс Микс** **Антистрессовый водорастворимый** **препарат нового поколения!!!**

Унікальний по складу і розробаний на основі довготривалих наукових експериментів по в'ясненню молекулярних механізмів розвитку стресів і шляхів їх профілактики, включаючи регуляцію генів і нутригеноміку. Препарат захищений двома патентами України.

### **Из чего состоит препарат?**

- *Природные антиоксиданты (витамин Е, витамин С и селен)*
- *Жиро- и водорастворимые витамины (А, ДЗ, Е, К и витамины группы В)*
- *Минералы (цинк, марганец и магний)*
- *Незаменимые аминокислоты (лизин и метионин)*
- *Гепатопротекторы (карнитин и бетаин)*
- *Осморегуляторы (бетаин)*
- *Электролиты (NaCl, NaHCO<sub>3</sub> и KCl)*
- *Органические кислоты (лимонная, пропионовая, муравьиная и сорбиновая)*
- *Стимуляторы аппетита (глутамат натрия)*



Представництво компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні [WWW.FEEDFOOD.COM.UA](http://WWW.FEEDFOOD.COM.UA)

Техническая и консультационная поддержка :

Доктор Биологических Наук

Сурай Петр Федорович

Директор Представительства компании в Украине

Прихода Игорь Зиновиевич моб. +38(050)473-28-32; +38(096)435-45-68;

Україна, 02089, м. Київ  
 пр. Броварський, 16 км. к. 9  
 тел.: 8(044) 549-07-57  
 факс: 8(044) 549-07-57

Р/р 26007901402401 у  
 ЗАТ « ОТП Банк» м. Київ  
 ЄДРПОУ 26600826 МФО 300528  
 ПІН 2660082265  
 Св-во № 35366232



### Показания к использованию:

- **Вакцинация** – препарат выпаивается 1-2 дня перед вакцинацией и 2-3 дня после вакцинации – для повышения эффективности вакцинации (50-100 г/100 литров воды).
- **Восстановление после различных заболеваний** – в течение 3-10 дней после применения антибиотиков или с момента окончания применения лекарственных средств (50-100 г/100 литров воды).
- **Повышение естественной резистентности организма при бактериальных, вирусных и паразитарных заболеваниях** – в течение 3-10 дней по показаниям (50-100 г/100 литров воды).
- **Метаболические нарушения** – в течение 2-7 дней при различных метаболических нарушениях, включая признаки недостатка витаминов, минералов, аминокислот и др. (20-100 г/100 литров воды).
- **Микотоксикоз** – при подозрении на наличие микотоксинов в кормах в течение 3-7 дней с возможностью повторных выпаиваний по показаниям. При подтверждении наличия микотоксинов в кормах препарат выпаивается совместно с применяемым адсорбентом в течение 3-7 дней в месяц (50-100 г/100 литров воды).
- **Иммunosupрессия** – в течение 3-7 дней для повышения эффективности иммунной системы и преодоления иммуносупрессии (50-100 г/100 литров воды).
- **Тепловой стресс** – в течение 2-4 дней перед предполагаемым тепловым стрессом, в период стресса и в течение 1-3 дней после стресса (50-100 г/100 литров воды).
- **Отлучка поросят** – 2-3 дня до отлучки и 2-3 дня после, для поддержания роста, развития, иммунитета (100 г/100 литров воды).
- **Профилактика стресса и уменьшение его негативного действия при формировании групп на доращивание** – в течение 2-4 дней перед предполагаемым формированием групп, в период, и в течение 1-3 дней после формирования групп (20-50 г/100 литров воды).
- **Перевод с доращивания на откорм** – в течение 2-4 дней перед предполагаемым переводом, в период, и в течение 2-3 дней после перевода (20-50 г/100 литров воды).
- **Плохой рост и развитие поросят и свиней** – в течение 3-10 дней для улучшения роста и развития (50-100 г/100 литров воды).
- **Смена рационов** - 1-2 дня перед сменой рациона и в течение 1-2 дней после смены рациона для лучшей адаптации пищеварения (50 г/100 литров воды).
- **Улучшение всасывания и стимуляция процессов пищеварения у поросят, свиноматок, хряков и свиней на откорме с последующим улучшением конверсии корма** - препарат способствует развитию полезной микрофлоры кишечника и поддерживает целостность энтероцитов. Используется в течение 3-10 дней ((50-100 г/100 литров воды).
- **Хряки в период интенсивного использования** – на протяжении всего интенсивного периода использования (100 г/100 литров воды).
- **Свиноматки (супоросные вторая половина после 90 дня )-** в течение 7-12 дней (100 г/100 литров воды).
- **Свиноматки (период лактации)** - в течение 10-21 дня (50-100 г/100 литров воды).
- **Перевозка свиней в другие хозяйства** – в течение 2-4 дней перед предполагаемой перевозкой и в течение 1-3 дней после перевозки (50-100 г/100 литров воды).
- **Взвешивание свиней** – в течение 1-3 дней перед взвешиванием, и в течение 1-2 дней после взвешивания (50-100 г/100 литров воды).
- **Процес отгрузки (взвешивание, погрузки и перевозка свиней) на бойни и мясоперерабатывающие предприятия** – в течение 2-5 дней перед отгрузкой (чтобы

Представництво компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні [WWW.FEEDFOOD.COM.UA](http://WWW.FEEDFOOD.COM.UA)

Техническая и консультационная поддержка:

Доктор Биологических Наук

Сурай Петр Федорович

Директор Представительства компании в Украине

Прихода Игорь Зиновиевич моб.+38(050)473-28-32; +38(096)435-45-68;

Україна, 02089, м. Київ  
пр. Броварський, 16 км. к. 9  
тел: 8(044) 549-07-57  
факс: 8(044) 549-07-57

Р/р 26007901402401 у  
ЗАТ «ОТП Банк» м. Київ  
ЄДРПОУ 26600826 МФО 300528  
ПІН 2660082265  
Св-во № 35366232



*минимизировать стресс и потери живого веса в процессе отгрузки, для снижения стресса и улучшения качества мяса) (50-100 г/100 литров воды).*

- **Любые другие стресс-условия** – в течение 1-10 дней по показаниям (20-100 г/100 литров воды).

**Не выявлено несовместимости препарата с другими препаратами, включая пре- и пробиотики, подкислители, адсорбенты микотоксинов и др.**

## **Доза и технология выпаивания:**

*Препарат выпаивается с водой из расчета 25-50 г на 100 литров воды. Например, если в корпусе потребление воды в сутки составляет 1000 литров, то выпаивается соответственно 250-500 г препарата в день. Необходимое на день количество препарата взвешивается и растворяется в воде из расчета 1 кг в 10-50 литрах воды. При этом необходимо тщательно перемешать препарат в воде и растворять в течение 10-15 минут при комнатной температуре.*

*Препарат выпаивается с помощью дозатора, отрегулированного на 1% или 2% соответственно. Желательно производить помешивание содержимого емкости каждые 2 часа в течение первых 8 часов выпаивания.*

*Если на дне емкости остается небольшой осадок, это не должно вызывать беспокойства – это не витамины, а наполнитель.*

**Во избежание развития микрофлоры в поилках, рекомендуется промывать поилки (сливать воду с концевика поилки) после окончания выпойки антистрессового препарата.**

## **Доза и технология скармливания:**

**Препарат рекомендуется использовать с кормом из расчета 1-2 кг на тонну комбикорма. При этом достигаются все вышеперечисленные положительные эффекты препарата.**

Представительство компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні [WWW.FEEDFOOD.COM.UA](http://WWW.FEEDFOOD.COM.UA)

Техническая и консультационная поддержка:

Доктор Биологических Наук

Сурай Петр Федорович

Директор Представительства компании в Украине

Прихода Игорь Зиновиевич моб. +38(050)473-28-32; +38(096)435-45-68;

Україна, 02089, м. Київ  
пр. Броварський, 16 км. к. 9  
тел: 8(044) 549-07-57  
факс: 8(044) 549-07-57

Р/р 26007901402401 у  
ЗАТ «ОТП Банк» м. Київ  
ЄДРПОУ 26600826 МФО 300528  
ПІН 2660082265  
Св-во № 35366232